

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *948* /UBND-VP
V/v tăng cường tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19

Thủ Dầu Một, ngày 19 tháng 5 năm 2022

KHẨN

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các phường;
- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường;
- 14 Trạm Y tế phường, Phòng khám ĐKKV Phú Mỹ.

Căn cứ Công văn số 947/VSDTTU-TCQG ngày 25/4/2022 của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương về việc tài liệu Hướng dẫn triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi;

Căn cứ Công văn số 1848/BYT-DP ngày 13/4/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin cho người đã mắc COVID-19;

Căn cứ Công văn số 1253/SYT-NVY ngày 11/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại 2 (mũi 4);

Căn cứ Công văn số 865/UBND-VP ngày 12/5/2022 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại 2 (mũi 4);

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-SYT ngày 16/5/2022 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 134 cho học sinh từ 6 đến dưới 12 tuổi trong các trường học và mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2022;

Thực hiện Công văn số 561/KSBT-PCBTN ngày 17/5/2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương về việc tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19,

Để đảm bảo hiệu quả vắc xin và tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng đúng tiến độ đề ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đề nghị đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi và triển khai tiêm mũi 4 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các địa phương; ưu tiên tiêm cho các đối tượng từ 50 tuổi trở lên, các cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

2. Tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống loa, đài địa phương và tuyên truyền đến người dân về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm chủng vắc

xin phòng COVID-19 cũng như những điều cần lưu ý sau khi tiêm vắc xin để người dân được hiểu, từ đó chủ động tham gia đi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

3. UBND phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 địa phương hỗ trợ nhân lực thực hiện nhập thông tin tiêm chủng lên Hệ thống tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 và làm sạch dữ liệu tiêm chủng; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể hỗ trợ, phối hợp với ngành y tế tổ chức tiêm chủng cho các nhóm đối tượng; đặc biệt, làm việc với các doanh nghiệp trên địa bàn kí cam kết tạo mọi điều kiện cho công nhân được tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm vắc xin phòng COVID-19.

4. Thực hiện thống kê, báo cáo tiến độ tiêm chủng đúng thời gian, biểu mẫu quy định về Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một.

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- BCĐ PCD COVID-19 thành phố;
- LĐVP
- Lưu: VT, Trâm



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Sĩ Nam

Phụ lục:**Tóm tắt hướng dẫn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
cho các nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Y tế**

(Đính kèm Công văn số 47/UBND-VP ngày 19/5/2022 của UBND Tp Thủ Dầu Một)

1. Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi*** Loại vắc xin sử dụng:**

- Vắc xin Moderna:

+ Đối tượng: trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.

+ Liều lượng: 0,25 ml/liều (chứa 50 mcg mRNA), bằng 1/2 so với liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên.

+ Lịch tiêm: 2 mũi, cách nhau 28 ngày.

- Vắc xin Pfizer:

+ Đối tượng: trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

+ Liều lượng: 0,2 ml/liều (chứa 10 mcg mRNA), bằng 1/3 hàm lượng trong liều vắc xin của người từ 12 tuổi trở lên. **KHÔNG** sử dụng vắc xin Pfizer của người từ 12 tuổi trở lên để tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

+ Lịch tiêm: 2 mũi, cách nhau 3-4 tuần.

*** Ghi chú:**

+ Trẻ tiêm mũi 1 loại vắc xin gì thì mũi 2 tiêm loại vắc xin đó, không được tiêm trộn các loại vắc xin.

- Trẻ 5 tuổi sẽ được tiêm vắc xin Pfizer, không tiêm vắc xin Moderna.

- Đối với trẻ bị mắc COVID-19: hoãn tiêm 03 tháng sau khi mắc COVID-19.

2. Trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi*** Loại vắc xin sử dụng:**

- Vắc xin Pfizer:

+ Liều lượng: 0,3 ml/liều (chứa 30 mcg mRNA)

+ Lịch tiêm: 2 mũi, cách nhau 3-4 tuần.

- Vắc xin khác: sẽ được cập nhật khi có hướng dẫn của Bộ Y tế.

*** Ghi chú:**

- Đối với trẻ bị mắc COVID-19: khám sàng lọc, tiêm theo quyết định số 5002/QĐ-BYT ngày 29/10/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn sửa đổi, bổ sung hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng covid-19 đối với trẻ em.

3. Đối tượng từ 18 tuổi trở lên

*** Liều cơ bản:** tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin.

- Loại vắc xin sử dụng: theo quyết định phê duyệt của Bộ Y tế, gồm: AstraZeneca, Moderna, Pfizer, VeroCell, Abdala,...

*** Liều bổ sung:**

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản, bao gồm:
+ Người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...

+ Người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc vắc xin Sputnik V.

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

- Đối tượng bị mắc COVID-19: tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định..

- Đối với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản

*** Tiêm liều nhắc lại lần 01:**

- Đối tượng: người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung.

- Khoảng cách: tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

- Loại vắc xin sử dụng: vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); Vắc xin do Astrazeneca sản xuất; vắc xin cùng loại với liều cơ bản, liều bổ sung;

- Đối với những người đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định.

*** Tiêm liều nhắc lại lần 02**

- Đối tượng: Người từ 50 tuổi trở lên; Người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng; Người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19: Cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân, người làm việc các khu công nghiệp.

- Vắc xin sử dụng: vắc xin mRNA (vắc xin do hãng Pfizer hoặc Moderna sản xuất); Vắc xin do Astrazeneca sản xuất; vắc xin cùng loại với mũi 3 (mũi nhắc lần 1);

- Khoảng cách: ít nhất là 4 tháng sau mũi 3 (mũi nhắc lần 1);

- Người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3: Trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19